

¿Es síndrome de Hunter?

Una larga lista de enfermedades infantiles y repetidas visitas al pediatra pueden ser preocupantes. A menudo es mejor saber qué podría estar causándolas. Encontrar una causa subyacente puede ser difícil, pero también puede ser un alivio, ya que puede ayudar a orientar la atención adecuada. El síndrome de Hunter, también llamado mucopolisacaridosis tipo II (MPS II), es un trastorno genético grave y progresivo que afecta principalmente a los niños varones.



Harry, 7 años de edad



Aiden, 5 años de edad



Ludwick, 9 años de edad



Case, 3 años de edad

Las personas con síndrome de Hunter pueden parecer normales al nacer, pero con el tiempo los síntomas comienzan a aparecer y a empeorar. Entre los 2 y los 4 años de edad, se puede observar un conjunto de algunos de los síntomas que se enumeran a continuación:¹

- Rasgos faciales toscos como cabeza y frente grandes, nariz ancha y labios gruesos
- Infecciones respiratorias recurrentes
- Goteo nasal crónico
- Problemas respiratorios, lo que incluye tener una respiración ruidosa y roncar
- Infecciones recurrentes en los oídos
- Lengua, amígdalas y adenoides agrandadas
- Soplo en el corazón
- Agrandamiento del abdomen debido a un agrandamiento del hígado y del bazo
- Pérdida de la audición
- Hernias
- Rigidez articular que lleva a movimientos torpes
- Diarrea acuosa recurrente
- Retraso del desarrollo y/o del lenguaje*

* Solo en caso de enfermedad grave.

1. Martin R et al. Pediatrics 2008; 121(2): e377–e386.

Si sospecha de la presencia de síndrome de Hunter, consulte a un profesional de la salud. Para obtener más información sobre el síndrome de Hunter, visite www.hunterpatients.com.






**Kingston,
6 años de edad**



**Silas,
5 años de edad**

**EI SÍNDROME
DE HUNTER afecta
a las personas de
diferentes maneras.**

No todas las personas
presentan los mismos
síntomas ni a todas les
afectan con la misma
intensidad.



**Jack,
6 años de edad**



**Kamil,
5 años de edad**

Si sospecha de la presencia de síndrome de Hunter, consulte a un profesional de la salud. Para obtener más información sobre el síndrome de Hunter, visite www.hunterpatients.com.

TAKEDA and the TAKEDA logo are trademarks or registered trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited. Copyright ©2019 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Lexington, MA 02421. All rights reserved. 1-800-828-2088.
S52632 10/19

